

Gollac M, et collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. Rapport remis au ministre du Travail. 2011.

Rapport final du groupe de travail sur les pathologies psychiques d'origine professionnelle. Conseil d'Orientation sur les conditions de Travail. Ministère du Travail. 2012.

Brunet S. La prévention des risques psychosociaux. Avis du conseil économique, social et environnemental. 2013.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.127>

## S6A

### Prévention des risques psychosociaux : un dispositif innovant en psychiatrie publique

Z. Zachariou

*Clinique du stress « Françoise-Le-Coz », groupe hospitalier Paul-Guiraud, Pôle 92G13, CMP de Garches, Garches, France*  
Adresse e-mail : [zzachariou@hotmail.com](mailto:zzachariou@hotmail.com)

La clinique du stress « Françoise-Le-Coz » est un dispositif original dans la psychiatrie publique et cela en intervenant sur deux axes. Son premier axe d'intervention (la prévention secondaire) concerne l'élaboration et la mise en place des actions de sensibilisation spécifiques. Elle tient compte de l'ambiance interpersonnelle et professionnelle et les particularités de la structure organisationnelle. Des facteurs comme la nature du métier et les récits des cadres et des salariés nécessitent des adaptations pédagogiques rapides et adéquates. La psychoéducation clarifie les particularités des orientations thérapeutiques. La définition du programme est l'objet d'un consensus organisationnel préalable et le cadre éthique est assuré. Son deuxième axe d'intervention (la prévention tertiaire) concerne les suivis médicopsychologiques. L'analyse de la demande et sa contextualisation sont essentielles. Au-delà de l'anamnèse classique, l'accent est mis sur certains facteurs relationnels et psychologiques. Les différents types de personnalité et d'attribution causale (interne ou externe) sont examinés par rapport à l'historique et l'évolution de la plainte. L'interaction des schémas de fonctionnement du patient avec des facteurs contextuels tels que les conditions et l'ambiance de travail entrent en considération dans la planification des traitements. De plus, on tient également compte de la subjectivité des différentes situations cliniques mais aussi organisationnelles et des limitations qui en découlent. Les stratégies thérapeutiques appliquées s'intègrent de façon réaliste dans une démarche pluridisciplinaire en tenant compte de la complexité du contexte médico-juridique et parfois financier.

En conclusion, le développement de ce type de structures hospitalières constitue une perspective d'ouverture avantageuse pour la psychiatrie publique. Il a comme vocation d'être un pivot essentiel du projet de « dispositif régional de prévention des risques psychosociaux » (DRPRP) d'Île-de-France.

**Mots clés** Risques psychosociaux ; Prise en charge ; Prévention ; Psychiatrie publique

**Déclaration d'intérêts** L'auteur ne déclare aucun conflit d'intérêt.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.128>

## S6B

### Pathologies psychiques d'origine professionnelle

N. Dantchev

*Unité de psychiatrie, Hôtel Dieu, Paris, France*  
Adresse e-mail : [nicolas.dantchev@htd.aphp.fr](mailto:nicolas.dantchev@htd.aphp.fr)

Résumé non reçu.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.129>

## S6C

### Influence des modifications organisationnelles sur la santé psychique

C. Jeoffrion

*Laboratoire de psychologie des Pays-de-la-Loire (LPPL – UPRES EA 4638), faculté de psychologie, université de Nantes, Nantes, France*  
Adresse e-mail : [Christine.Jeoffrion@univ-nantes.fr](mailto:Christine.Jeoffrion@univ-nantes.fr)

Cette communication a pour objectif de montrer l'intérêt que représente une méthodologie mixte et participative dans le processus de prévention des RPS à partir de la présentation d'un diagnostic « psycho-socio-organisationnel » mené au sein d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ayant subi de profonds changements durant les dernières décennies. La méthodologie quantitative repose sur un questionnaire d'auto-évaluation et sur trois échelles validées : le Job Content Questionnaire (JCQ), le Maslach Burnout Inventory (MBI), et l'Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). La méthodologie qualitative repose sur l'étude de documents internes à l'établissement, sur des entretiens semi-directifs et des observations de situations de travail. Les moyennes aux différents questionnaires sont plutôt inférieures aux moyennes nationales, mais font état de grandes disparités en fonction des catégories socioprofessionnelles. Les thèmes abordés lors des entretiens viennent confirmer le fait que la structure n'est pas dans une situation critique sur le plan des RPS, mais nécessite néanmoins qu'un plan d'actions soit mis en place. Deux facteurs de risques parmi les 6 proposés par la DARES (2010) s'avèrent prégnants : le « temps de travail » et l'« exigence émotionnelle ». Les aide-soignantes, les agents de service hospitalier, les aides médico-psychologiques et les infirmières se trouvent en première ligne des personnes ciblées par de possibles troubles. La méthodologie mixte et participative participe du processus de prévention des RPS en favorisant la mise en évidence des origines diverses des RPS, et en permettant que les préconisations soient co-construites tout au long du diagnostic, ce qui est essentiel pour la pérennité des actions qui seront mises en place. Notre recherche-intervention permet de proposer un modèle de diagnostic transférable à d'autres structures.

**Mots clés** Risques psychosociaux ; Méthodologie mixte ; Burnout ; Stress ; Diagnostic organisationnel ; Professionnels de santé ; Santé au travail.

**Déclaration d'intérêts** L'auteur ne déclare aucun conflit d'intérêt.  
*Pour en savoir plus*

DARES. Les risques psychosociaux au travail : les indicateurs disponibles. 2010 (n° 81, décembre).

Jeoffrion C, Barré S. Accompagner le processus de changement lors d'une fusion : réflexions autour d'une expérience d'intervention psychosociale en organisation. *Psychologie Du Travail et Des Organisations* 2011;17:90–107.

Jeoffrion C, Hamard J-P, Barré S, Boudoukha AH. Diagnostic organisationnel et prévention des risques psycho-sociaux dans un établissement d'accueil pour personnes âgées : l'intérêt d'une approche mixte et participative. *Le Travail Humain* [à paraître].

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.130>

## S12

### Adversité sociale et troubles mentaux

P. Courtet

*U888 Inserm, service de psychologie médicale et psychiatrie, hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier, Montpellier, France*  
Adresse e-mail : [p-courtet@chu-montpellier.fr](mailto:p-courtet@chu-montpellier.fr)

Il est établi que les facteurs de risque sociaux jouent un rôle important dans la genèse et le maintien des troubles mentaux. Les modèles animaux nous indiquent que les expériences précoces d'adversité sociale peuvent avoir des effets à long terme à travers un « conditionnement biologique » et que le cerveau serait « modelé » par les facteurs environnementaux. En effet, des expériences