

Sérotonine - Dopamine - Noradrénaline
de leur équilibre dépend l'harmonie



MOCLAMINE®

m o c l o b é m i d e

ANTIDEPRESSEUR ROCHE

1^{er} REGULATEUR TRIAMINERGIQUE

COMPOSITION : Moclobémide : 150 mg par comprimé pelliculé sécable. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES* :** Antidépresseur agissant par inhibition préférentielle et réversible de la monoamine-oxydase (MAO) de type A. **ELEMENTS DE PHARMACOCINETIQUE* :** Biodisponibilité moyenne de 60% après prise unique, supérieure à 80% après prise multiple. Volume apparent de distribution 1,2 l/kg. La liaison aux protéines est de 50%. **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :** Traitement des états dépressifs de toute nature, y compris les dépressions endogènes. **CONTRE-INDICATIONS :** Absolues : — Hypersensibilité connue au moclobémide. — Grossesse. Chez l'animal : les études n'ont pas montré d'effet tératogène ou fœtotoxique. Dans l'espèce humaine : les études animales ne pouvant être extrapolées, et en l'absence de données cliniques, ce médicament ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte. — Allaitement. Les données disponibles ont mon-

tré le passage du moclobémide dans le lait maternel (5% de la dose administrée). — Enfants de moins de 15 ans. Relatives : — Association avec les sympathomimétiques (cf. Interactions médicamenteuses). **PRECAUTIONS D'EMPLOI* :** En cas de traitement antérieur par un IMAO non sélectif. Chez les patients à tendance suicidaire. Chez des patients psychotiques. Chez les malades traités par les antihypertenseurs. Chez les patients porteurs d'un phéochromocytome. En cas d'anesthésie générale. En l'absence d'information, il est préférable de ne pas associer au lithium ni à la carbamazépine. En cas d'association avec un morphinique avec l'alcool ; chez les patients hypertendus. **EFFETS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES* :** Recommandation de prudence. **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS* :** Association avec : — Les sympathomi-

métiques : prudente. — Les morphiniques : une diminution de la posologie du morphinique. — L'ibuprofène : éventuel ajustement de sa posologie. — La cimétidine : ajustement de sa posologie. — Les antidépresseurs tricycliques : un traitement par le moclobémide peut être débuté aussitôt après un traitement par un antidépresseur tricyclique et inversement. — Les neuroleptiques : leurs effets indésirables risquent d'être majorés. — Le lithium : association déconseillée. — La carbamazépine : préférable de ne pas associer. **EFFETS INDÉSIRABLES* :** Rares effets observés de façon transitoire : troubles du sommeil, vertiges, nausées, céphalées. Dans de très rares cas : des états confusionnels qui ont disparu rapidement à l'arrêt du traitement. En cas d'associations avec les neuroleptiques : hypotension orthostatique, tachycardie. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION* :** La fourchette posologique optimale se situe entre 300 et 600 mg/jour.

La posologie moyenne est de 450 mg/jour. La dose totale quotidienne doit être fractionnée en 2 ou 3 prises. Sujets âgés et insuffisants rénaux : ajustement de la posologie non nécessaire. Insuffisants hépatiques sévères : posologie diminuée d'un tiers ou de moitié. Les comprimés doivent être pris à la fin des repas. **SURDOSAGE* :** Traitement symptomatique effectué en milieu hospitalier. **DURÉE DE STABILITE :** 3 ans **PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :** A conserver à température ambiante. **PRESENTATION :** 333 249-3 : 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC-Aluminium). 333 250-1 : 100 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC-Aluminium). Conditionnement réservé à l'usage hospitalier. Liste I — Prix : 60,20 F (30 comprimés) — Remb. Séc. Soc. à 65% — Collect. **TITULAIRE DE L'AMM :** Produits Roche S2, bd du Parc — 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX — Tél. : (1) 46 40 50 00. * Pour une information plus complète, consulter le dictionnaire VIDAL.



JUILLET 1994

1578/P/JAR/94-11/01